

<ワクチンの違い・比較>

	ロタリックス	ロタテック
メーカー	グラクソ・スミスクライン	MSD
一般名	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン
ワクチン	1価 ヒト由来 ロタウイルスの中で最も多いG1型由来 交差免疫によって他の型にも有効	5価 ウシ由来 G1型,G2型,G3型,G4型,P1A[8]型
効能・効果	ロタウイルスによる胃腸炎の予防 G1P [8] G2P [4] G3P [8] G4P [8] G9P [8] に対する予防効果が示唆	
剤型	内用液	内用液
接種方法	経口投与 1回 1.5ml 4週間以上間隔をおいて2回	経口投与 1回 2ml 4週間以上間隔をおいて3回
接種期間	生後6週から 初回接種は14週6日までが推奨 24週までに接種完了	生後6週から 初回接種は14週6日までが推奨 32週までに接種完了
主な副作用	易刺激性(ぐずり) (7.3%) 下痢 (3.5%) 咳嗽 /鼻漏 (3.3%) 国内臨床試験 508例中 投与後30日以内	下痢 (5.5%) 嘔吐 (4.2%) 胃腸炎 (3.4%) 発熱 (1.3%) 国内臨床試験 380例中 投与後14日以内
腸重積症	ロタウイルスワクチンの接種(特に初回接種)後、1~2週間程度の間は、腸重積症の発症リスクが高まるとの報告があります。	